

葉いもち情報第6号

- - 2010年7月30日発表 - -

葉いもちの発生は平年並み。発生圃場では穂いもちの基幹防除を！

18日以降は感染好適日がほとんど出現していません（表1）。7月下旬の葉いもちの発生状況は平年並みですが、一部地域では発病程度のやや高い圃場が散見され、発病株率は過去5か年のうちでは最も高くなっています（表2）。葉いもち発生圃場においては、今後穂いもちの発生が懸念されますので、基幹防除の徹底が必要です。

表1 BLASTAMによる葉いもちの感染好適日の出現状況

	隠岐の島	海士	鹿島	松江	出雲	大田	掛合	奥出雲	飯南	川本	浜田	邑南	弥栄	益田	津和野	吉賀
7月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月21日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

：感染好適日 ：感染準好適日 - ：出現せず ? ：判定不能

表2 葉いもちの発病株率（県東部・7月下旬）

2000年	33.0%
2001年	34.4
2002年	33.6
2003年	37.8
2004年	53.7
2005年	0.4
2006年	1.0
2007年	3.9
2008年	6.6
2009年	3.1
2010年	11.1



図1 葉いもち（無防除）

今年の葉いもち情報は、今回で終了します。