

島根県水稲奨励品種特性表

種類	早晩性	品種名	来歴 [育成場所] (育成年)	採用年次	供試年次	播種期 月日	移植期 月日	出穂期 月日	成熟期 月日	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/m ²	芒の多少・長短	ふ先色	草型	穂発芽性	脱粒性	玄米の色・光沢	心白の多少	腹白の多少	玄米					10a当り収量					品質	食味	諸抵抗性					適地	栽培適性	概評															
																					千粒重 g	粒径 mm	全重 kg	精粒重 kg	玄米重 kg	上	中	下	弱	中			強	弱	中	強	弱			中	強	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	優点	欠点
うるち	極早	ハナエチゼン	越南122号×フクヒカリ [福井農試] (平成3年)	平13	平26 ～ 30 ¹⁾	4.17 4.15	5.08 5.09	7.18 7.23	8.17 8.27	70.3 68.4	18.7 18.1	395 398	稀・短	黄・白	偏・数	や・難	中・難	中・無	無	無	23.2 23.8	5.3 2.9	1183 1203	645 657	495 523	6 4	上 中	強 中	や 強	中 中	や 強	中 強	強	県内全域	早期栽培	良質、穂発芽や や難	食味																		
	極早	コシヒカリ	農林22号×農林1号 [福井農試] (昭和31年)	昭36	平26 ～ 30	4.17 4.16	5.08 5.09	7.27 8.02	8.29 9.11	82.9 85.7	20.1 19.5	365 431	稀・短	黄・白	中・難	や・難	中・難	中・無	無	無	23.0 23.1	5.2 2.9	1264 1551	681 850	516 660	6 4	上 上	弱 強	弱 強	や 強	中 中	中 強	弱	県内全域但し、 肥沃地は避ける	早期又は早植栽培、 多肥栽培は避ける	良食味、多収、 穂発芽難	いもち病弱、耐 倒伏性弱、耐暑 性やや劣る																		
	極早	つや姫	山形70号×東北164号 [山形農総研] (平成21年)	平24	平26 ～ 30 ¹⁾	4.16 4.16	5.08 5.09	7.26 8.02	8.27 9.11	71.9 71.9	18.5 18.0	364 429	稀・短	黄・白	中・難	や・難	中・難	中・微	無	無	22.8 22.9	5.1 2.9	1238 1496	673 830	525 665	4 4	上 上	強 強	中 強	中 中	中 強	強	県内平坦部	早植栽培～普通 期栽培	良質、良食味、 耐倒伏性強	心白粒がやや発 生しやすい																			
	早	きぬむすめ	キヌヒカリ×愛知92号(祭り晴) [九州沖縄農研C] (平成17年)	平17	平26 ～ 30	4.17 4.16	5.09 5.09	8.08 8.17	9.14 10.06	82.4 74.1	18.6 17.3	342 345	稀・短	黄・白	中・中	中・難	中・難	中・無	無	無	22.9 23.6	5.2 2.9	1534 1524	742 783	583 634	4 4	上 上	中 中	中 中	中 弱	中 中	弱 中	中	平坦～中山間部	早植～普通期栽 培	良食味、良質、 多収	白葉枯病やや 弱、耐冷性弱																		
	極早	五百万石	菊水×新200号 [新潟農試] (昭和32年)	昭51	平26 ～ 30	— 4.16	— 5.09	— 7.23	— 9.02	— 81.8	— 21.4	— 315	稀・短	黄・白	重・難	や・難	中・難	中・多	無	無	— 27.7	5.5 3.2	— 1267	— 745	— 591	— 4	— 中	や 弱	や 弱	中 中	中 弱	強	山間～中山間部	早期栽培	酒造好適米、早 熟	耐冷性やや弱、 低温発芽性劣る																			
	極早	神の舞	五百万石×美山錦 [島根農試] (平成8年)	平8	平26 ～ 30	— 4.16	— 5.09	— 7.25	— 9.05	— 85.2	— 21.0	— 293	無・白	黄・重	や・難	中・難	中・多	無	無	無	— 28.6	5.5 3.3	— 1285	— 772	— 618	— 4	— 中	や 弱	や 弱	中 中	中 中	中	山間～中山間部	早期栽培	酒造好適米、多 収、耐冷性強	倒伏やや弱、白 葉枯病弱																			
	極早	佐香錦	改良八反流×金紋錦 [島根農試] (平成12年)	平13	平26 ～ 30	— 4.16	— 5.09	— 7.27	— 9.07	— 83.4	— 21.5	— 339	無・白	黄・重	偏・難	や・難	中・難	中・多	中	中	— 28.2	5.8 3.2	— 1377	— 783	— 575	— 4	— 中	や 弱	中 中	中 弱	中 弱	強	中山間部	早期栽培	酒造好適米、多 収	いもち病やや 弱、耐冷性やや 弱																			
もち	中	改良雄町	比婆雄町×近畿33号 [島根農試赤名分場] (昭和35年)	昭35	平26 ～ 30	— 4.16	— 5.09	— 8.15	— 9.28	— 88.8	— 20.9	— 356	中・中	黄・白	偏・重	や・難	中・難	中・多	無	無	— 27.1	5.6 3.1	— 1331	— 669	— 527	— 4	— 中	中 中	中 中	中 中	中 中	弱	山間～中山間 部、肥沃地は避 ける	早植栽培、多肥 栽培は避ける	酒造好適米、良 質	耐倒伏性弱																			
	極早	ヒメノモチ	大系227×こがねもち [東北農試] (昭和47年)	昭53	平26 ～ 30 ²⁾	4.17 4.16	5.08 5.08	7.20 7.28	8.20 9.02	80.9 76.8	20.7 18.6	349 333	稀・短	黄・白	偏・重	易・難	乳白 乳白	乳白 乳白	— —	— —	23.2 23.2	5.2 3.0	1181 1223	620 649	491 527	5 4	上 中	や 強	や 強	中 中	中 中	中 強	強	県内全域	早期栽培	良質、多収、早 熟、強稈	穂発芽易																		
	極早	ココノエモチ	中部26号×稲系糯108 [愛知山間実験農場] (昭和63年)	平2	平26 ～ 30 ³⁾	4.17 4.15	5.08 5.07	7.25 8.04	8.26 9.09	74.0 69.0	19.4 18.9	377 322	稀・短	赤・褐	偏・数	難・難	難・難	乳白 乳白	乳白 乳白	— —	— —	22.1 22.7	5.1 2.9	1250 1195	646 645	479 515	6 4	上 上	中 強	中 強	中 弱	中 強	強	県内全域	早期栽培	餅質良、多収、 穂発芽難	紋枯病弱																		
	早	ミコトモチ	山陰糯83号×中部糯57号 [島根農技C] (平成19年)	平20	平26 ～ 30 ¹⁾	4.16 —	5.09 —	8.10 —	9.19 —	86.8 —	20.2 —	375 —	中・中	褐・中	中・中	中・難	乳白 乳白	乳白 乳白	— —	— —	25.9 —	5.4 3.0	1506 —	638 —	502 —	6 —	上 上	や 弱	中 中	中 中	中 中	中	平坦～中山間 部、標高200m以 下	早植栽培	餅の外観及び食 味良好、多収	葉いもちやや 弱、胴切米発生 しやすい																			

注) 上段:農業技術センター、下段:中山間地域研究センターにおける成績。

- 1) 供試年次について農業技術センターのハナエチゼン、つや姫およびミコトモチ、中山間地域研究センターのハナエチゼンは平成29年を除く平25～30のデータ。
- 2) 供試年次について中山間地域研究センターのヒメノモチは平26～28
- 3) 供試年次について中山間地域研究センターのココノエモチは平18～22のデータ