

【Gửi đến nhân viên đang làm việc
tại trang trại nuôi gà】

【Tỉnh Shimane】

Mức độ cảnh báo
cao nhất

Hãy cảnh giác với dịch cúm gà có khả năng lây nhiễm cao !

Để phòng ngừa lây nhiễm, việc tự bản thân thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống là hết sức quan trọng !

① Biện pháp phòng chống để các loài động vật hoang dã như chim, chuột.v.v không thể xâm nhập, tiếp cận.

•Đẩy mạnh việc khử trùng, vệ sinh trang trại, xung quanh nơi nuôi gia cầm

Khử trùng các khu vực có chứa nước như ao, đầm.v.v



•Kiểm tra, xác nhận tại trang trại gà có dấu hiệu xâm nhập của động vật hoang dã.v.v hay không
Nếu phát hiện các lỗ hổng.v.v ngay lập tức phải báo cho nhân viên chăn nuôi, quản lý vệ sinh của trại



Cũng có trường hợp mèo xâm nhập từ khe hở của dây chuyên tập kết trứng

Lưới thép bị rách Lỗ hổng của tường

② Thực hiện triệt để các biện pháp khử trùng, **thay ủng (giày cao cổ) khi ra vào trang trại.**



Bố trí các nơi chuyên dùng để đặt ủng, giày

③ Khử trùng sau khi rửa sạch ủng (giày cao cổ) , **thường xuyên thay thuốc khử trùng mỗi ngày của khay khử trùng.v.v.**



Khử trùng sau khi rửa sạch



Thay thuốc khử trùng

Thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe mỗi ngày của gia cầm.
Nếu phát hiện có điểm bất thường, ngay lập tức phải liên hệ với
Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y gần nhất.

Thông tin liên quan đến dịch cúm gà của
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản →

