

# 身体障害者診断書・意見書

**音声機能障害用**  
**言語機能障害用**  
**そしゃく機能障害用**

総括表

|   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
| 氏名  | 生年月日 | 年      月      日生 ( )歳  | 男 ・ 女      |
| 住所 島根県  |      |  |            |
| 1 障害名   |      |  |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>音声機能</b> (喉頭摘出、発声筋麻痺、その他( ))</li> <li>・ <b>言語機能障害</b> (失語症、運動障害性&lt;麻痺性&gt;構音障害、その他( ))</li> <li>・ <b>そしゃく機能障害</b> (そしゃく・嚥下機能障害、咬合異常によるそしゃく機能障害)</li> </ul> |      |  |            |
| 2 原因となった (障害の直接原因である疾病名を記載。「喉頭腫瘍」「脳血管障害」等)  |      | 労災 その他の事故  |            |
| 疾病・外傷名  |      | 自然災害・疾病・先天性<br>その他( )  |            |
| 3 疾病・外傷発生年月日  |      | 年      月      日  | 場所         |
| 4 参考となる経過・現症  |      | (「経過」については、症状が固定するまでの経過を簡単に記載。「現症」はコミュニケーション活動の能力の程度を裏付ける客観的所見ないしは検査所見を記載) |            |
| 障害固定または障害確定(推定) 年      月      日   |      |  |            |
| 5 総合所見 (参考となる経過・現症又は個別の所見欄に書かれた現症の事項を総合して、その総合的能力が生活上のコミュニケーション活動をどのように制限しているかを記載。)   |      |  |            |
| [将来再認定 要( 軽度化 ・ 重度化 ) ・ 不要]<br>[再認定の時期 年      月 ]   |      |  |            |
| 6 その他参考となる合併症状  |      |  |            |
| 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。<br>年      月      日  |      |  |            |
| 病院または診療所の名称   |      | 電話 ( )   |            |
| 所在地   |      |  |            |
| 診療担当科名  |      | 科  | 指定医師氏名(自署) |
| 身体障害者福祉法第15条第3項の意見(障害程度等級についても参考意見を記入)  |      |  |            |
| 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に  |      | 該当等級にした根拠  |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 該当する ( 級相当)</li> <li>・ 該当しない</li> </ul>  |      |  |            |
| 注意 ① 障害区分や等級決定のため、心と体の相談センターから改めて問い合わせする場合があります。<br>② 身体障害者福祉法第15条第3項の意見の欄は、指定医師必携の「身体障害者障害程度等級表」に基づき記入すること。  |      |  |            |

## [はじめに]〈認定要領を参照のこと〉

この診断書においては、以下の4つの障害区分のうち、認定を受けようとする障害について、□に✓をいれて選択し、その障害に関する「状態及び所見」について記載すること。

なお、音声機能障害、言語機能障害及びそしやく機能障害が重複する場合については、各々について障害認定することは可能であるが、等級はその中の最重度の等級をもって決定する旨、留意すること（各々の障害の合計指数をもって等級決定することはしない）。

- 聴覚障害 → 『1 「聴覚障害」の状態及び所見』に記載すること。
- 平衡機能障害 → 『2 「平衡機能障害」の状態及び所見』に記載すること。
- 音声・言語機能障害 → 『3 「音声・言語機能障害」の状態及び所見』に記載すること。
- そしやく機能障害 → 『4 「そしやく機能障害」の状態及び所見』に記載すること。

## 1 「聴覚障害」の状態及び所見


## (1)聴力（会話音域の平均聴力レベル）

|   |    |
|---|----|
| 右 | dB |
| 左 | dB |

## (4)聴力検査の結果（ア又はイのいずれかを記載する）

## ア 純音による検査

## オージオメータの型式




## イ 語音による検査

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 語音明瞭度 | 右 | % |
|       | 左 | % |

## (3)鼓膜の状態

(右) (左)



## (5)身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況

有・無

(注) 2級と診断する場合に記載すること。

## 2 「平衡機能障害」の状態及び所見

## 3 「音声・言語機能障害」の状態及び所見

## [記入上の注意]

- (1)聴力障害の認定にあたっては、JIS規格によるオージオメータで測定すること。  
dB値は、周波数500, 1000, 2000Hzにおいて測定した値をそれぞれa, b, cとした場合、  
 $\frac{a+2b+c}{4}$ の算式により算定し、a, b, cのうちいずれか1又は2において100dBの音が聴取できなければ、当該dB値を105dBとして当該算式を計上し、聴力レベルを算定すること。
- (2)聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に対し、2級を診断する場合には、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査（遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテスト等）を実施し、その結果（実施した検査方法及び検査所見）を、総括表の「4参考となる経過・現症」欄に記載し、記録データのコピーを添付すること。

## 4 「そしゃく機能障害」の状態及び所見

## (1) 障害の程度及び検査所見

下の「該当する障害」の□に✓を入れ、さらに①又は②の該当する□に✓又は( )内に必要事項を記述すること。

- |          |  |
|----------|--|
| 「該当する障害」 | <input type="checkbox"/> そしゃく・嚥下機能の障害<br>→ 「①そしゃく・嚥下機能の障害」に記載すること。         |
|          | <input type="checkbox"/> 咬合異常によるそしゃく機能の障害<br>→ 「②咬合異常によるそしゃく機能の障害」に記載すること。 |

## ① そしゃく・嚥下機能の障害

## a 障害の程度

- 経口的に食物等を摂取できないため、経管栄養を行っている。
- 経口摂取のみでは十分に栄養摂取ができないため、経管栄養を併用している。
- 経口摂取のみで栄養摂取ができるが、誤嚥の危険が大きく摂取できる食物の内容・摂取方法に著しい制限がある。
- その他

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## b 参考となる検査所見

## ア 各器官の一般的検査

## &lt;参考&gt; 各器官の観察点

- ・ 口唇・下顎：運動能力、不随意運動の有無、反射異常ないしは病的反射
- ・ 舌：形状、運動能力、反射異常
- ・ 軟 口 蓋：拳上運動、反射異常
- ・ 声 带：内外転運動、梨状窩の唾液貯溜

- 所 見 (上記の枠内の「各器官の観察点」に留意し、異常の部位、内容、程度等を詳細に記載すること。)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## イ 嚥下状態の観察と検査

## &lt;参考1&gt; 各器官の観察点

- ・ 口腔内保持の状態
- ・ 口腔から咽頭への送り込みの状態
- ・ 咽頭拳上と咽頭内腔の閉鎖の状態
- ・ 食道入口部の開大と流動物 (bolus) の送り込み

## &lt;参考2&gt; 摂取できる食物の内容と誤嚥に関する観察点

- ・ 摂取できる食物の内容 (固形物、半固形物、流動食)
- ・ 誤嚥の程度 (毎回、2回に1回程度、数回に1回、ほとんど無し)

## ○ 観察・検査の方法

- エックス線検査 ( )
- 内視鏡検査 ( )
- その他 ( )

- 所 見 (上記の枠内の <参考1> と <参考2> の観察点から、嚥下状態について詳細に記載すること。)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

② 咬合異常によるそしゃく機能の障害

a 障害の程度

- 著しい咬合障害があり、歯科矯正治療等を必要とする。  
 その他

b 参考となる検査所見（咬合異常の程度及びそしゃく機能の観察結果）

ア 咬合異常の程度（そしゃく運動時又は安静位咬合の状態を観察する。）

イ そしゃく機能（口唇・口蓋裂では、上下顎の咬合関係や形態異常等を観察する。）

(2) その他（今後の見込み等）

(3) 障害程度の等級

（下の該当する障害程度の等級の項目の□に✓を入れること。）

① 「そしゃく機能の喪失」（3級）とは、経管栄養以外に方法のないそしゃく・嚥下機能の障害をいう。

具体的な例は次のとおりである。

- 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの  
 延髓機能障害（仮性球麻痺、血管障害を含む）及び末梢神経障害によるもの  
 外傷、腫瘍切除等による顎（顎関節を含む）、口腔（舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等）、咽頭、喉頭の欠損等によるもの

② 「そしゃく機能の著しい障害」（4級）とは、著しいそしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障害をいう。

具体的な例は次のとおりである。

- 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの  
 延髓機能障害（仮性球麻痺、血管障害を含む）及び末梢神経障害によるもの  
 外傷・腫瘍切除等による顎（顎関節を含む）、口腔（舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等）、咽頭、喉頭の欠損等によるもの  
 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの

[記入上の注意]

(1) 歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、「歯科医師による診断書・意見書」（別様式）の提出を求めるものとすること。

(2) 小腸機能障害を併せもつ場合については、必要とされる栄養摂取の方法等がどちらの障害によるものであるか等について詳細に診断し、該当する障害について認定することが必要である。