




免疫



病原体





医療従事者等



高齢者



高齢者以外の基礎疾
患がある方
高齢者施設等で従事
されている方



それ以外の方
(16歳以上)

ワクチンを受けられない

- ・明らかに発熱している方（※1）
- ・重い急性疾患にかかっている方
- ・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症（※2）の既往歴のある方
- ・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

かかりつけ医へ相談を！



（※1）明らかな発熱とは通常37.5°C以上を指します。ただし、37.5°Cを下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。




注意

ワクチンを受けるのに注意が必要

- ・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方
- ・過去にけいれんを起こしたことがある方
- ・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
- ・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方は、接種後の出血に注意が必要

かかりつけ医へ相談を！






感染予防は引き続きお願いします



手洗い(手指消毒)



マスクの着用



人との距離