

表1 水稲作況試験生育調査結果の概要

令和8年6月2日

農業技術センター作物科

	出雲												飯南		
	つきあかり (4/25植)			つや姫 (5/10植)			コシヒカリ (5/10植)			きぬむすめ (5/10植)			コシヒカリ (5/1植)		
	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)	本年	平年	平年比 (平年差)
苗乾物重(mg)	16.7	18.3	92	18.9	15.1	126	16.2	13.7	118	18.1	13.6	133	12.8	10.9	117
移植時	2.4	2.3	0.0	2.2	2.1	0.1	2.1	2.1	-0.0	2.1	2.0	0.1	2.4	2.3	0.2
+20日	5.2	5.0	0.2	6.7	5.6	1.1	6.5	5.5	1.0	6.3	5.3	1.0			
+30日	7.6	6.8	0.7		7.5			7.3			7.0		7.4	6.4	1.0
+40日		8.6			9.0			8.8			8.6			7.9	
+50日		9.9			10.0			9.8			9.8			9.3	
+60日		11.1			11.2			11.0			10.8			10.3	
+70日		12.2			12.2			12.1			11.8			11.3	
+80日														12.5	
+90日														12.7	
止葉葉位														12.7	
移植時	12.2	12.2	100	13.6	12.1	113	12.3	12.4	99	11.3	13.0	87	14.2	11.4	125
+20日	22.4	23.9	94	28.3	23.9	118	26.5	23.4	113	24.4	23.6	103			
+30日	31.4	30.1	104		28.2			27.4			26.5		27.7	22.8	121
+40日		39.1			44.8			42.7			40.7			27.7	
+50日		54.6			57.2			55.3			51.7			37.7	
+60日		72.0			72.0			69.3			69.1			51.6	
+70日		85.3			83.1			82.5			81.5			67.0	
+80日											94.5			79.3	
+90日											103.9			92.6	
移植時	56	56	100	56	56	100	89	89	100	89	89	100	67	67	100
+20日	65	64	101	224	155	144	319	205	156	236	187	126			
+30日	203	158	129		329			405			380		213	204	105
+40日		285			543			607			603			356	
+50日		410			572			609			634			547	
+60日		423			539			563			601			611	
+70日		396			495			493			534			562	
+80日											483			510	
+90日											451			467	
+40日		41.8			44.0			40.2			39.9			38.3	
+50日		43.9			41.4			36.7			36.9			39.0	
+60日		43.2			40.9			33.9			35.3			38.2	
+70日		43.0			39.0			34.4			35.2			36.0	
+80日					38.6			36.1			35.2			34.8	
+90日											35.2			34.3	
最高莖数(本/m ²)		427			577			626			557			601	
幼穂形成期		6.21			7.02			7.04			7.14			7.04	
出穂期		7.15			7.25			7.26			8.09			7.29	
成熟期		8.16			8.28			8.28			9.17			9.06	
穂数(本/m ²)		356			415			399			411			384	
稈長(cm)		79.2			76.5			82.3			83.9			80.3	
穂長(cm)		20.3			18.5			19.0			18.8			18.6	

注1) 平年値は前10ヶ年の平均値。4/25植「つきあかり」は前7ヶ年の平均値。

注2) 「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の元肥窒素施用量はそれぞれ4、4、2、3、5、2.5kg/10a。

「つきあかり」「つや姫」「コシヒカリ」「きぬむすめ」「コシヒカリ(赤名)」の総窒素施用量はそれぞれ8、7、5、10、5kg/10a。「つや姫」は特別栽培基準による栽培。

注3) 栽植密度は22.2株(株間15cm、条間30cm)、1株4本植え。ただし、「飯南コシヒカリ」は1株3本植え、「つきあかり」及び「つや姫」は栽植密度18.5株(株間18cm、条間30cm)・1株3本植え。